



## 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - 医師の治療を受けている人
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振

まれに下記のような重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。  
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

### 【用法及び用量】

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
大人（15歳以上）	15丸	3 回
15 歳 未 満	服用しないこと	

食間又は空腹時に水又は温湯にて服用する。  
添付のさじで1回量をはかっておのみください。

食間とは…

食後2～3時間を指します。

### 【成分及び分量】

45丸（9,000mg、1日量）中

成 分	含 量	成 分	含 量
ケ イ ヒ	1,161mg	ト ウ ニ ン	1,161mg
ブ ク リ ョ ウ	1,161mg	シ ャ ク ヤ ク	1,161mg
ポ タ ン ビ	1,161mg		

添加物としてハチミツ、寒梅粉、白色セラックを含有します。

### 【効能又は効果】

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：  
月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭重、打ち身（打撲症）、しもやけ、しみ、湿疹・皮膚炎、にきび

### （効能又は効果に関連する注意）


血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです。

#### ●比較的体力がある



- めまい
- にきび
- しみ

- のぼせ
- 頭重
- 肩こり



- 更年期障害
- 血の道症
- 湿疹・皮膚炎

- 下腹部痛
- 月経不順
- 月経異常
- 月経痛

- 打ち身（打撲症）
- 足冷え
- しもやけ